

# THE UROLOGY GROUP

www.urologygroupvirginia.com

---

1860 Town Center Drive • Suite 150/160 • Reston, VA 20190 • 703-480-0220  
19415 Deerfield Avenue • Suite 112 • Leesburg, VA 20176 • 703-724-1195  
224-D Cornwall Street, NW • Suite 400 • Leesburg, VA 20176 • 703-443-6733 24430  
24430 Stone Springs Blvd • Ste 100B • Dulles • VA 20166 • 703-957-1022

---

## CISTECTOMÍA RADICAL (REMOCIÓN DE LA VEJIGA) INSTRUCCIONES PREOPERATIVAS

PACIENTE: \_\_\_\_\_

FECHA DE LA OPERACIÓN: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

LLEGA A LA REGISTRACION: \_\_\_\_\_

CIRUJANO: \_\_\_\_\_

**\*Dependiendo del lugar donde se realice su operación, la hora fijada para su cirugía podría cambiar. De ser así, ellos se pondrán en contacto con usted para comunicarle la nueva hora y cuándo debe llegar.\***

1. Si usted tiene más de 50 años, usted está obligado a tener un electrocardiograma con fecha dentro de un año de su fecha de procedimiento. (Esto es requerido por la anestesia.) Usted puede obtener un electrocardiograma realizado con su médico de cabecera, cardiólogo o en el hospital. **Usted es responsable de obtener el electrocardiograma realizado 6 meses antes de su procedimiento o su procedimiento puede ser cancelado.**
2. Si tiene instrucciones para laboratorios, EKG, rayos X del pecho o visita con su doctor. Contactar al ellos para una cita.
3. **NO TOME** ninguna aspirina o compuestos similares a la aspirina durante los siete días anteriores a la cirugía. Esto incluye Advil, Nuprin, Motrin, Bufferin o Anacin. **NO TOME** Vitamina E, multivitaminas o aceite de pescado siete días antes de la cirugía. Todos estos pueden adelgazar la sangre. **USTED PUEDE TOMAR TYLENOL.**
4. Si usted está tomando un anticoagulante, como Coumadin (warfarin), o es diabético, infórme de ello al hacer la cita para la cirugía.
5. Un día antes de la cirugía, consuma solamente líquidos claros. Tomar suficiente líquidos. Beba dos botellas de diez onzas de la [Bebida de Nutrición Asegurada Previa a la Cirugía](#) (disponible en Amazon.com) o 16.9 onzas de Gatorade a las 6 pm la noche anterior a la cirugía. **SIN ALIMENTOS SÓLIDOS DESPUÉS MEDIANOCHE.** Puede continuar tomando líquidos claros hasta dos horas y media antes de su cirugía. Ver líquidos claros en la página siguiente.
6. Beba una botella de diez onzas de la [Bebida de Nutrición Asegurada Previa a la Cirugía](#) (disponible en Amazon.com) o diez onzas de Gatorade dos horas y treinta minutos antes de la cirugía (cuatro horas antes de la cirugía si es diabético). **NADA POR LA BOCA POR DOS HORAS ANTES DE LA CIRUGÍA.**

7. Nuestra oficina obtendrá la autorización previa necesaria de su compañía de seguros. Si tiene preguntas sobre la cobertura / pago, solicite el código de procedimiento de CPT a nuestra oficina y llame a su compañía de seguros.

**Inova Loudoun Hospital**

44055 Riverside Parkway  
Leesburg, VA 20176  
Preop Dept: (703) 858-6768  
www.inova.org

**Reston Hospital Center**

1850 Town Center Parkway  
Reston, VA 20190  
Preop Dept: (703) 639-9005  
[www.restonhospital.com](http://www.restonhospital.com)

**StoneSprings Hospital Center**

24440 Stone Springs Blvd  
Dulles, VA 20166  
Pre-op Dept: (571) 349-4600  
www.stonespringshospital.com

**LÍQUIDOS CLAROS**

Té y café (sin crema o leche)

Bebidas carbonatadas

Bebidas con sabor a frutas

Zumos de frutas colados: manzana, uva, uva blanca, limonada (sin pulpa) Caldo claro, consomé

Gelatina de sabor claro como la gelatina.